

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones del producto. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad, las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto. Mezcle los ingredientes con un removedor, nunca con las manos aunque tenga los guantes puestos. No coma, beba o fume durante las aplicaciones. No se aplique contra el viento. No use la boca para trasvasar plaguicidas ni sople boquillas de aspersión obturadas.

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: La ingestión en pequeñas cantidades de zeolita micronizada e hidróxido de cobre, produce cólicos, diarrea y vómito.

TRATAMIENTO MÉDICO: Administrar vía oral 30 ml de leche de magnesia, leche o clara de huevo batidos en agua.

FUNGICIDA A BASE DE ZEOLITA MICRONIZADA E HIDRÓXIDO DE COBRE EN SUSPENSIÓN ACUOSA

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

GARANTÍA: Como la aplicación, manejo, transporte y almacenaje de este producto están fuera de nuestro control, Tribomex Productos Minerales, no se hace responsable del mal uso del mismo y solamente garantiza la composición correcta y el contenido neto.

AGÍTESE VIGOROSAMENTE



LIGERAMENTE TÓXICO



"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS"



FUNGICIDA AGRÍCOLA / SUSPENSIÓN ACUOSA DE ZEOLITA MICRONIZADA CON HIDRÓXIDO DE COBRE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS:

Zeolita micronizada
Hidróxido de cobre: con un contenido de cobre metálico como elemento no menor de 65% (equiv. a 212 g de i.a./lt)
INGREDIENTES INERTES
Diluyente, dispersantes y acondicionadores

% EN PESO
No menos de: 39.65

No menos de: 21.35

No más de: 39.00
Total: 100.00

REGISTRO EN TRÁMITE

CONTENIDO NETO. 1.0 L

PRECAUCIÓN

Suflumin-Cu es un producto ligeramente tóxico por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y los ojos.

FECHA DE CADUCIDAD: 2 AÑOS
DESPUÉS DE LA FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:
LOTE No.

FORMULADO POR:
Tribomex Productos Minerales
Exhuberancia #10 Col. Esmeralda
Jiutepec, Mor. 62550
Tel (777) 319-7747
e-mail: info@tribomex.com.mx
www.tribomex.com.mx



AGÍTESE VIGOROSAMENTE



INSTRUCCIONES DE USO

Suflumin-Cu es un fungicida de uso agrícola recomendado para la prevención de enfermedades fúngicas en cultivos agrícolas a las dosis recomendadas.

CULTIVOS	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS lt/Ha
CHILE	Antracnosis	Colletotrichum	1.5
CEBOLLA	Mildiu vellosa	Perenospora destructor	1.5
CUCURBITÁCEAS	Mildiu vellosa Mancha de la hoja	Pseudoperonospora sp Alternaria cucumeria	1.5 1.5
JITOMATE	Tizón temprano Tizón tardío Mancha de la hoja	Alteria solani Phytophthora infestans Glomerella singulata	1.5 1.5 1.5

Nota: Producto exento de intervalo de seguridad

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Agite vigorosamente el envase antes de abrir, este producto es preventivo, deberá aplicarse al aparecer las primeras plantas afectadas.

Suflumin-Cu está formulado como suspensión acuosa y debe mezclarse en las dosis recomendadas con agua suficiente para el cubrimiento uniforme de las plantas tratadas, de 200 a 400 litros por hectárea.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso, cuando la velocidad del viento sea alta, ni cuando exista una alta probabilidad de lluvia.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico a las dosis recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con productos de reacción alcalina.